



## Anatomia człowieka - podstawowy

Możesz sprawdzić swoją wiedzę z zakresu anatomii. Pytania mają zróżnicowany stopień trudności. Twoja wiedza jest podstawowa, jeśli odpowiedziałeś poprawnie na 55% pytań. Wynik 55-65% oznacza znajomość przeciętną, 65-75% - dobrą, 75-90% bardzo dobrą, >90% - celującą.

Poziom trudności: Średni

1. Do gruczołów wydzielania wewnętrznego zaliczysz wszystkie wymienione z wyjątkiem:

- A - tarczyca
  - B - przytarczyce
  - C - śledziona
  - D - nadnercza
  - E - jajnik
- 

2. Tak zwana "szyjka chirurgiczna" jest częścią

- A - kości łokciowej
  - B - kości ramiennej
  - C - kości udowej
  - D - kości biodrowej
  - E - kości guzicznej
- 

3. Przed guzkiem przednim wyrostka poprzecznego szóstego kręgu szyjnego biegnie:

- A - tętnica szyjna wspólna
  - B - tętnica szyjna zewnętrzna
  - C - tętnica szyjna wewnętrzna
  - D - tętnica poprzeczna szyi
  - E - tętnica kręgowa
- 

4. Uszereguj we właściwej kolejności kości pierwszego szeregu nadgarstka od przyśrodka do boku:

- A - łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta, grochowata
  - B - łódkowata, księżycowata, trójgraniasta, grochowata
  - C - czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowata, haczykowata
  - D - grochowata, trójgraniasta, księżycowata, łódeczkowata
  - E - księżycowata, grochowata, czworoboczna większa, haczykowata
-



5. Umowną granicą między górnym odcinkiem przewodu pokarmowego i jego pozostałą częścią jest

- A - więzadło wieszadłowe dwunastnicy
  - B - pierwsza pętla jelita czczego
  - C - zastawka krętniczo-kątnicza
  - D - brodawka dwunastnicza większa
  - E - odźwiernik
- 

6. Spośród wymienionych niżej odpowiedzi wskaż tę, która najlepiej opisuje unerwienie mięśni gałki ocznej

- A - nerw okoruchowy odpowiada za ruch gałki ocznej do boku
  - B - porażenie nerwu VI powoduje ustawienie gałki ocznej w zezie rozbieżnym
  - C - mięsień prosty boczny jest unerwiony przez nerw VI
  - D - mięśnie gałkoruchowe unerwione są jedynie z gałązek nerwu okoruchowego
  - E - nerw błokowy unerwia mięsień prosty górny powodując ruch gałki ocznej ku górze
- 

7. Pierwszy neuron drogi czuciowej znajduje się:

- A - we wzgórzu
  - B - w receptorach na powierzchni ciała
  - C - w zwojach rdzeniowych
  - D - w rogu bocznym rdzenia kręgowego
  - E - w móście
- 

8. Śluzówkę przelyku pokrywa w większości:

- A - nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący
  - B - nabłonek cylindryczny
  - C - nabłonek migawkowy
  - D - nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący
  - E - nabłonek jednowarstwowy płaski
- 

9. Lewe ujście żyłne to inaczej:

- A - zatoka wieńcowa
  - B - lewy przedsionek
  - C - zastawka mitralna
  - D - zastawka aortalna
-

- E - zastawka trójdzielna
- 

10. Uszereguj narządy leżące w miednicy małej kobiety zaczynając od tego, który leży najbardziej z przodu, a kończąc na tym z tyłu.

- A - pęcherz moczowy-macica-odbytnica
  - B - macica-odbytnica-jajnik-pęcherz moczowy
  - C - pęcherz moczowy-odbytnica-macica
  - D - pęcherz moczowy-stercz-macica-odbytnica
  - E - odbytnica-pochwa-macica-jajnik
- 

11. Po zabiegu usunięcia macicy powikłaniem może być zastój moczu w nerce, ponieważ tętnica maciczna krzyżuje się z moczowodem.

- A - Oba zdania są prawdziwe i istnieje między nimi związek
  - B - oba zdania są prawdziwe i nie ma między nimi żadnego związku
  - C - oba zdania są fałszywe
  - D - pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe
  - E - pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe
- 

12. Spośród poniższych wybierz narząd, który całkowicie leży zewnątrzstrzewnowo:

- A - nerki
  - B - jelito cienkie
  - C - żołądek
  - D - śledziona
  - E - wątroba
- 

13. Nerw strzemiączkowy jest gałęzią nerwu

- A - przedsionkowego
  - B - ślimakowego
  - C - usznego wielkiego
  - D - twarzowego
  - E - językowo-gardłowego
- 

14. Do mięśni przepony moczowo płciowej nie należy:

- A - mięsień kulszowo-jamisty
  - B - mięsień opuszkowo-gąbczasty
-

- C - mięsień poprzeczny krocza powierzchowny
  - D - mięsień zwieracz cewki moczowej
  - E - mięsień dzwignacz odbytu
- 

15. Najdłuższą kreskę posiada:

- A - żołądek
  - B - śledziona
  - C - esica
  - D - jelito cienkie
  - E - zstępnica
- 

16. Uszereguj podprzeponowe gałęzie aorty, rozpoczynając od położonej najwyżej, kończąc na najniższej.

- A - pień trzewny-tętnica krezkowa górna-tętnice nerkowe-tętnica krezkowa dolna
  - B - tętnica krezkowa górna-tętnice nerkowe-pień trzewny-tętnica krezkowa dolna
  - C - pień trzewny-tętnica krezkowa górna-tętnica krezkowa dolna-tętnice nerkowe
  - D - tętnice nerkowe-pień trzewny-tętnica krezkowa górna-tętnica krezkowa dolna
  - E - pień trzewny-tętnica krezkowa dolna-pień trzewny-tętnica krezkowa górna
- 

17. Do żył powierzchownych należą wszystkie z wyjątkiem:

- A - żyła odpiszczelowa (vena saphena magna)
  - B - żyła odstrzałkowa (vena saphena parva)
  - C - żyła odpromieniowa (vena cephalica)
  - D - żyła odłokciowa (vena basilica)
  - E - żyła ramieniowa (vena brachialis)
- 

18. Ułożenie dłoni w tzw. rękę położnika (błogosławiącą) może wynikać z porażenia lub niedowładu:

- A - nerwu pośrodkowego
  - B - nerwu łokciowego
  - C - nerwu promieniowego
  - D - nerwu promieniowego i pośrodkowego, ale tylko gdy wystąpią jednocześnie
  - E - nerwu ramienno-promieniowego
-



## Anatomia człowieka - podstawowy

Możesz sprawdzić swoją wiedzę z zakresu anatomii. Pytania mają zróżnicowany stopień trudności. Twoja wiedza jest podstawowa, jeśli odpowiedziałeś poprawnie na 55% pytań. Wynik 55-65% oznacza znajomość przeciętną, 65-75% - dobrą, 75-90% bardzo dobrą, >90% - celującą.

Poziom trudności: Średni

### Karta odpowiedzi

1. C
2. B
3. A
4. A
5. A
6. C
7. C
8. D
9. C
10. A
11. A
12. A
13. D
14. E
15. C
16. A
17. E
18. A