

Unerwienie mięśni kończyny górnej

Test z anatomii - z zakresu unerwienia mięśni kończyny górnej

Poziom trudności: Trudny

1. m. naramienny (m. deltoideus) jest unerwiony przez:

- A - n. pachowy
 - B - n. nadłopatkowy
 - C - n. mięśniowo-skórny
 - D - n. promieniowy
 - E - n. łokciowy
-

2. m. nadgrzebieniowy (m. supraspinatus) jest unerwiony przez:

- A - n. pachowy
 - B - n. nadłopatkowy
 - C - nn. podłopatkowe
 - D - n. mięśniowo-skórny
 - E - n. promieniowy
-

3. m. podgrzebieniowy (m. infraspinatus) jest unerwiony przez:

- A - n. pachowy
 - B - n. nadłopatkowy
 - C - nn. podłopatkowe
 - D - n. mięśniowo-skórny
 - E - n. promieniowy
-

4. m. obły mniejszy (m. teres minor) jest unerwiony przez:

- A - n. pachowy
 - B - n. nadłopatkowy
 - C - nn. podłopatkowe
 - D - n. mięśniowo-skórny
 - E - n. promieniowy
-

5. m. obły większy (m. teres maior) jest unerwiony przez:

- A - n. pachowy
 - B - n. nadłopatkowy
-

- C - nn. podłopatkowe
 - D - n. mięśniowo-skórny
 - E - n. promieniowy
-

6. m. podłopatkowy (m. subscapularis) jest unerwiony przez:

- A - n. pachowy
 - B - n. nadłopatkowy
 - C - nn. podłopatkowe
 - D - n. mięśniowo-skórny
 - E - n. promieniowy
-

7. m. dwugłowy ramienia (m. biceps brachii) jest unerwiony przez:

- A - n. pachowy
 - B - n. mięśniowo-skórny
 - C - n. promieniowy
 - D - n. pośrodkowy
 - E - n. łokciowy
-

8. m. kruczo-ramienny (m. coracobrachialis) jest unerwiony przez:

- A - n. pachowy
 - B - n. mięśniowo-skórny
 - C - n. promieniowy
 - D - n. pośrodkowy
 - E - n. łokciowy
-

9. m. ramienny (m. brachialis) jest unerwiony przez:

- A - n. pachowy
 - B - n. mięśniowo-skórny
 - C - n. promieniowy
 - D - n. pośrodkowy
 - E - n. łokciowy
-

10. m. trójgłowy ramienia (m. triceps brachii) jest unerwiony przez:

- A - n. pachowy
 - B - n. mięśniowo-skórny
-

- C - n. promieniowy
 - D - n. pośrodkowy
 - E - n. łokciowy
-

11. m. łokciowy (m. anconeus) jest unerwiony przez:

- A - n. pachowy
 - B - n. mięśniowo-skórny
 - C - n. promieniowy
 - D - n. pośrodkowy
 - E - n. łokciowy
-

12. m. nawrotny obły (m. pronator teres) jest unerwiony przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
 - B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

13. m. zginacz nadgarstka promieniowy (m. flexor carpi radialis) jest unerwiony przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
 - B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

14. m. dłoniowy długi (m. palmaris longus) jest unerwiony przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
 - B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

15. m. zginacz palców powierzchowny (m. flexor digitorum superficialis) jest unerwiony przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
-

- B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

16. m. zginacz nadgarstka łokciowy (m. flexor carpi ulnaris) jest unerwiony przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
 - B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

17. m. zginacz głęboki palców (m. flexor digitorum profundus) jest unerwiony przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
 - B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

18. m. zginacz kciuka długi (m. flexor pollicis longus) jest unerwiony przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
 - B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

19. m. nawrotny czworoboczny (m. pronator quadratus) jest unerwiony przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
 - B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

20. m. ramiennie-promieniowy (m. brachioradialis) jest unerwiony przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
-

- B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

21. m. prostownik nadgarstka promieniowy długi (m. extensor carpi radialis longus) jest unerwiony przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
 - B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

22. m. prostownik nadgarstka promieniowy krótki (m. extensor carpi radialis brevis) jest unerwiony przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
 - B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

23. m. odwracacz (m. supinator) jest unerwiony przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
 - B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

24. grupa tylna mięśni przedramienia (m. prostownik palców, m. prostownik palca małego, m. prostownik nadgarstka łokciowy, m. odwodziciel kciuka długi, m. prostownik kciuka długi, m. prostownik kciuka krótki, m. prostownik wskaziciela) jest unerwiona przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
 - B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
-

- E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

25. Mięśnie kłębu kciuka (m. odwodziciel kciuka krótki, m. zginacz kciuka krótki, m. przeciwstawiacz kciuka, m. przywodziciel kciuka) są unerwione przez:

- A - głowa głęboka m. zginacza kciuka krótkiego unerwiona jest przez n. łokciowy
 - B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - głowa głęboka m. zginacza kciuka krótkiego unerwiona jest przez n. promieniowy
-

26. Mięśnie kłębiku palca małego (m. dłoniowy krótki, m. odwodziciel palca małego, m. zginacz krótki palca V, m. przeciwstawiacz palca V) unerwione są przez:

- A - n. mięśniowo-skórny
 - B - n. promieniowy
 - C - n. pośrodkowy
 - D - n. łokciowy
 - E - n. promieniowy (gałąź głęboka)
-

27. Zaznacz zdanie prawdziwe:

- A - mięśnie glistowate (mm. lumbricales) unerwione są przez nerw pośrodkowy (I i II) i przez nerw łokciowy (III i V)
 - B - mięśnie glistowate (mm. lumbricales) unerwione są przez nerw promieniowy (I i II) i przez nerw pośrodkowy (III i V)
 - C - Mięśnie międzykostne dłoniowe i grzbietowe (mm. interossei palmares et dorsales) unerwione są przez n. łokciowy
 - D - Mięśnie międzykostne dłoniowe i grzbietowe (mm. interossei palmares et dorsales) unerwione są przez n. promieniowy
 - E - Mięśnie międzykostne dłoniowe i grzbietowe (mm. interossei palmares et dorsales) unerwione są przez n. pośrodkowy
-



Unerwienie mięśni kończyny górnej

Test z anatomii - z zakresu unerwienia mięśni kończyny górnej

Poziom trudności: Trudny

Karta odpowiedzi

1. A
2. B
3. B
4. A
5. C
6. C
7. B
8. B
9. B
10. C
11. C
12. C
13. C,
14. C,
15. C,
16. D,
17. C, D,
18. C,
19. C,
20. B,
21. E,
22. E,
23. E,
24. E,
25. A, C,
26. D,
27. A, C,