

Unerwienie mięśni brzucha i klatki piersiowej

Test z anatomii - z zakresu unerwienia mięśni brzucha i klatki piersiowej

Poziom trudności: Trudny

1. M. czworoboczny lędźwi (m. quadratus lumborum) jest unerwiony przez:

- A - Nerw podżebrowy
 - B - Gałęzie krótkie splotu lędźwiowego
 - C - Nerw udowy
 - D - Nerwy międzyżebrowe V-XII
 - E - Nerw biodrowo-pachwinowy
-

2. M. lędźwiowy większy (m. psoas major) jest unerwiony przez:

- A - Nerw podżebrowy
 - B - Gałęzie krótkie splotu lędźwiowego
 - C - Nerw udowy
 - D - Nerwy międzyżebrowe V-XII
 - E - Nerw biodrowo-pachwinowy
-

3. M. lędźwiowy mniejszy (m. psoas minor) jest unerwiony przez:

- A - Nerw podżebrowy
 - B - Gałęzie krótkie splotu lędźwiowego
 - C - Nerw udowy
 - D - Nerwy międzyżebrowe V-XII
 - E - Nerw biodrowo-pachwinowy
-

4. M. biodrowy (m. iliacus) jest unerwiony przez:

- A - Nerw podżebrowy
 - B - Gałęzie krótkie splotu lędźwiowego
 - C - Nerw udowy
 - D - Nerwy międzyżebrowe V-XII
 - E - Nerw biodrowo-pachwinowy
-

5. M. skośny zewnętrzny brzucha (m. obliquus externus abdominis) jest unerwiony przez:

- A - Nerw podżebrowy
 - B - Nerwy międzyżebrowe V-XII
-

- C - Nerw płciowo-udowy
 - D - Nerw biodrowo-podbrzuszny
 - E - Nerw biodrowo-pachwinowy
-

6. M. skośny wewnętrzny brzucha (m. obliquus internus abdominis) jest unerwiony przez:

- A - Nerw podżebrowy
 - B - Nerwy międzyżebrowe V-XII
 - C - Nerw płciowo-udowy
 - D - Nerw biodrowo-podbrzuszny
 - E - Nerw biodrowo-pachwinowy
-

7. M. poprzeczny brzucha (m. transversus abdominis) jest unerwiony przez:

- A - Nerw podżebrowy
 - B - Nerwy międzyżebrowe V-XII
 - C - Nerw płciowo-udowy
 - D - Nerw biodrowo-podbrzuszny
 - E - Nerw biodrowo-pachwinowy
-

8. M. prosty brzucha (m. rectus abdominis) jest unerwiony przez:

- A - Nerw podżebrowy
 - B - Nerwy międzyżebrowe V-XII
 - C - Nerw płciowo-udowy
 - D - Nerwy międzyżebrowe VI-XII
 - E - Nerw udowy
-

9. M. piramidowy (m. pyramidalis) jest unerwiony przez:

- A - Nerw podżebrowy
 - B - Nerwy międzyżebrowe V-XII
 - C - Nerw płciowo-udowy
 - D - Nerwy międzyżebrowe VI-XII
 - E - Nerw udowy
-

10. M. piersiowy większy (m. pectoralis major) unerwiony jest przez:

- A - nerw piersiowy przedni boczny
 - B - nerw piersiowy przedni przyśrodkowy
-

- C - nerw piersiowy długi
 - D - nerw podobojczykowy
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IX
-

11. M. piersiowy mniejszy (m. pectoralis minor) unerwiony jest przez:

- A - nerw piersiowy przedni boczny
 - B - nerw piersiowy przedni przyśrodkowy
 - C - nerw piersiowy długi
 - D - nerw podobojczykowy
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IX
-

12. M. zębaty przedni (musculus serratus anterior) jest unerwiony przez:

- A - Nerw podżebrowy
 - B - Nerwy międzyżebrowe V-XII
 - C - nerw piersiowy długi
 - D - nerw podobojczykowy
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IX
-

13. M. podobojczykowy (m. subclavius) jest unerwiony przez:

- A - nerw podżebrowy
 - B - nerw piersiowy przedni przyśrodkowy
 - C - nerw piersiowy długi
 - D - nerw podobojczykowy
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IX
-

14. MM. międzyżebrowe zewnętrzne (musculi intercostales externi) są unerwione przez:

- A - Nerw podżebrowy
 - B - Nerwy międzyżebrowe V-XII
 - C - nerwy międzyżebrowe II-VI
 - D - Nerwy międzyżebrowe VI-XII
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IX
-

15. MM. międzyżebrowe wewnętrzne (musculi intercostales interni) są unerwione przez:

- A - nerw podżebrowy
 - B - nerwy międzyżebrowe V-XII
 - C - nerwy międzyżebrowe II-VI
 - D - nerwy międzyżebrowe VI-XII
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IX
-

16. MM. podżebrowe (mm. subcostales) są unerwione przez:

- A - nerw podżebrowy
 - B - nerwy międzyżebrowe V-XII
 - C - nerwy międzyżebrowe II-VI
 - D - nerwy międzyżebrowe VI-XII
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IX
-

17. M. poprzeczny klatki piersiowej (m. transversus thoracis) jest unerwiony przez:

- A - nerw podżebrowy
 - B - nerwy międzyżebrowe V-XII
 - C - nerwy międzyżebrowe II-VI
 - D - nerw piersiowy długi
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IX
-

18. M. czworoboczny (m. trapezius) jest unerwiony przez:

- A - gałąź zewnętrzna nerwu dodatkowego (XI)
 - B - gałęzie ze splotu szyjnego
 - C - nerw piersiowo-grzbietowy
 - D - nerw grzbietowy łopatki
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IV
-

19. M. najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi) jest unerwiony przez:

- A - gałąź zewnętrzna nerwu dodatkowego (XI)
 - B - gałęzie ze splotu szyjnego
 - C - nerw piersiowo-grzbietowy
 - D - nerw grzbietowy łopatki
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IV
-

20. M. równoległoboczny (m. rhomboideus) jest unerwiony przez:

- A - gałąź zewnętrzna nerwu dodatkowego (XI)
 - B - gałęzie ze splotu szyjnego
 - C - nerw piersiowo-grzbietowy
 - D - nerw grzbietowy łopatki
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IV
-

21. M. dźwigacz łopatki (m. levator scapulae) jest unerwiony przez:

- A - nerwy międzyżebrowe IX-XI
 - B - gałęzie ze splotu szyjnego
 - C - nerw piersiowo-grzbietowy
 - D - nerw grzbietowy łopatki
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IV
-

22. M. półkolcowy klatki piersiowej i szyi jest unerwiony przez:

- A - odgałęzienia przyśrodkowe od gałęzi tylnych odpowiednich nerwów rdzeniowych
 - B - odgałęzienia boczne od gałęzi tylnych odpowiednich nerwów rdzeniowych
 - C - gałęzie splotu szyjnego
 - D - nerw grzbietowy łopatki
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IV
-

23. M. półkolcowy głowy (m. semispinalis capitis) jest unerwiony przez:

- A - odgałęzienia przyśrodkowe od gałęzi tylnych odpowiednich nerwów rdzeniowych
 - B - odgałęzienia boczne od gałęzi tylnych odpowiednich nerwów rdzeniowych
 - C - gałęzie splotu szyjnego
 - D - nerw grzbietowy łopatki
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IV
-

24. M. najdłuższy (m. longissimus) jest unerwiony przez:

- A - odgałęzienia przyśrodkowe od gałęzi tylnych odpowiednich nerwów rdzeniowych
 - B - odgałęzienia boczne od gałęzi tylnych odpowiednich nerwów rdzeniowych
 - C - nerw piersiowo-grzbietowy
 - D - nerw grzbietowy łopatki
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IV
-

25. M. biodrowo-żebrowy (m. iliocostalis) jest unerwiony przez:

- A - odgałęzienia przyśrodkowe od gałęzi tylnych odpowiednich nerwów rdzeniowych
 - B - odgałęzienia boczne od gałęzi tylnych odpowiednich nerwów rdzeniowych
 - C - gałęzie splotu szyjnego
 - D - nerw grzbietowy łopatki
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IV
-

26. M. zębaty tylny górny (m. serratus posterior superior) jest unerwiony przez:

- A - nerwy międzyżebrowe IX-XI
 - B - gałęzie ze splotu szyjnego
 - C - nerw piersiowo-grzbietowy
 - D - nerw grzbietowy łopatki
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IV
-

27. M. zębaty tylny dolny (m. serratus posterior inferior) jest unerwiony przez:

- A - nerwy międzyżebrowe IX-XI
 - B - gałęzie ze splotu szyjnego
 - C - nerw piersiowo-grzbietowy
 - D - nerw grzbietowy łopatki
 - E - nerwy międzyżebrowe I-IV
-



Unerwienie mięśni brzucha i klatki piersiowej

Test z anatomii - z zakresu unerwienia mięśni brzucha i klatki piersiowej

Poziom trudności: Trudny

Karta odpowiedzi

1. A, B,
2. B, C,
3. B, C,
4. B,
5. A, B, D, E,
6. A, B, D, E,
7. A, B, C, D, E,
8. D,
9. A,
10. A, B,
11. B,
12. C,
13. D,
14. E,
15. E,
16. E,
17. D,
18. A, B,
19. C,
20. D,
21. B, D,
22. A,
23. A,
24. B,
25. B,
26. E,
27. A,