



Farmakologia TEST

Test z farmakologii na podstawie podręcznika E. Mutschler.

Poziom trudności: Średni

1. Przeciwwskazaniem do podania morfiny jest:

- A - ostry obrzęk płuc
 - B - ból nowotworowy
 - C - ostra porfiria wątrobowa
 - D - zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
-

2. Wskaż zdanie prawdziwe:

- A - morfina powoduje wysypienie biegunki
 - B - odtrutką na morfinę jest fenytoina
 - C - alkohol nasila działanie morfiny
 - D - morfina pobudza ośrodek oddechowy
-

3. Efekty ośrodkowe opioidowych leków przeciwbólowych to:

- A - euforia
 - B - anksjoliza
 - C - sztywność mięśni
 - D - wszystkie odpowiedzi są poprawne
-

4. Czyściami agonistami receptorów opioidowych to:

- A - petydyna, pentazocyna, morfina
 - B - morfina, nalokson, oksykodon
 - C - L-metadon, petydyna, hydromorfon
 - D - morfina, buprenorfina, pentazocyna
-

5. W leczeniu substytucyjnym osób uzależnionych od opioidów stosuje się:

- A - buprenorfinę, metadon
 - B - oksykodon, morfinę
 - C - nie stosuje się żadnych leków
 - D - nalokson
-

6. Spośród wymienionych leków najsilniej działa:

- A - remifentanyl
 - B - fentanyl
 - C - alfentanyl
 - D - sufentanyl
-

7. Pochodne dihydromorfiny to:

- A - dihydrokodeina, kodeina, hydromorfon
 - B - diamorfina, kodeina
 - C - hydrokodon, oksykodon, dihydrokodeina
 - D - brak poprawnej odpowiedzi
-

8. wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące naloksonu:

- A - stosuje się go do diagnostyki różnicowej śpiaczek i ostrych zatruc opioidami.
 - B - znosi działanie leków opioidowych
 - C - nie powoduje wystąpienia zależności lekowej
 - D - jest podawany doustnie i dożylnie
-

9. kodeina wykazuje działanie:

- A - przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
 - B - przeciwbólowe i przeciwkaszlowe
 - C - przeciwbólowe i urykozuryczne
 - D - przeciwzapalne i przeciwkaszlowe
-

10. Biodostępność preparatów morfiny typu retard wynosi około:

- A - 90%
 - B - 80%
 - C - 40%
 - D - 25%
-

11. Do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) nie należy:

- A - diklofenak
 - B - kwas acetylosalicylowy
 - C - paracetamol
 - D - ibuprofen
-

- E - acemetacyna
-

12. Lewometadon:

- A - jest prawie 4-krotnie silniejszy od morfiny i dłuższy jest także okres jego działania
 - B - jest prawie 4-krotnie słabszy od morfiny, ale dłuższy jest okres jego działania
 - C - jego objawy niepożądane wydają się silniejsze niż morfiny
 - D - objawy abstynencyjne rozwijają się szybciej niż w przypadku morfiny
-

13. Do działań niepożądanych opioidowych leków przeciwbólowych zaliczamy:
1. szpilkowate źrenice (mioza) 2. szerokie, niereagujące na światło źrenice 3. nudności
4. wymioty 5. tachykardia 6. bradykardia 7. zawroty głowy 8. hipotensja 9. świąd 10.
nadmierne pocenie 11. pobudzenie psychoruchowe

- A - 1, 4, 5, 7, 9
 - B - 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11
 - C - 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 - D - 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
 - E - brak prawidłowej odpowiedzi
-

14. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące hydromorfonu:

- A - działa słabiej niż morfina
 - B - wykazuje silny efekt pierwszego przejścia
 - C - biodostępność po podaniu doustnym wynosi 90%
 - D - należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 - E - nie wykazuje działania przeciwkaszlowego
-

15. preparat TARGIN zawiera:

- A - naltrekson i oksykodon
 - B - nalokson i buprenorfinę
 - C - naltrekson i morfinę
 - D - nalokson i oksykodon
-



Farmakologia TEST

Test z farmakologii na podstawie podręcznika E. Mutschler.

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. C
2. C
3. D
4. C
5. A
6. D
7. C
8. D
9. B
10. C
11. C
12. A
13. E
14. B
15. D