

## Farmakologia

Poziom trudności: Średni

### 1. Farmakodynamika to

- A - nauka o wpływach czynników dziedzicznych na działanie leków
  - B - nauka o zmianach czynności organizmu pod wpływem działania leku i mechanizmie działania leku
  - C - nauka o losach leku w ustroju
  - D - nauka o postaciach farmakologicznych leków
- 

### 2. L.z.Rp

- A - lek przeznaczony do wydania bezpłatnego
  - B - lek do stosowania w lecznictwie zamkniętym
  - C - lek z 30% odpłatnością
  - D - lek z 50% odpłatnością
- 

### 3. Trimetoprim + Sulfametoksazol to przykład leków działających

- A - przeciwstawnie do siebie i nie mogące być łączone z powodu groźnych interakcji
  - B - synergistycznie
  - C - antagonistycznie kompetywnie
  - D - antagonistycznie niekompetywnie
- 

### 4. Niebezpiecznym skutkiem ubocznym stosowania leku tuberkulostatycznego Etambutolu to:

- A - uszkodzenie nerek
  - B - uszkodzenie wątroby
  - C - uszkodzenie nerwu wzrokowego
  - D - bóle stawowe w wyniku zwiększenia kwasu moczowego we krwi
- 

### 5. Podstawowe leki tuberkulostatyczne to

- A - izoniazyd, etambutol, kanamycyna
  - B - izoniazyd, ryfampicyna, etambutol
  - C - izoniazyd, ryfampicyna, PAS
  - D - izoniazyd, PAS, pirazynamid
-

6. Podstawą zasadą farmakoterapii gruźlicy jest:

- A - monoterapia
  - B - stosowanie leków tylko bakteriostatycznych
  - C - stosowanie leków tylko bakteriobójczych
  - D - leczenie skojarzone
- 

7. Lekiem bakteriobójczym nie jest

- A - ryfampicyna
  - B - izoniazyd
  - C - etambutol
  - D - streptomycyna
- 

8. Najniebezpieczniejszym tuberkulostatykiem jest

- A - izoniazyd
  - B - ryfampicyna
  - C - kapreomycyna
  - D - cykloseryna
- 

9. Bactrim, Bisetol to nazwy handlowe

- A - trimetoprimu + sulfatiazyny
  - B - trimetoprimu + sulfametoksazolu
  - C - trimetazydyny + sulfacetamidu
- 

10. Nifuroksazyd wchłania się z przewodu pokarmowego

- A - prawda
  - B - fałsz
- 

11. Mechanizm działania chinolonów to

- A - uszkodzenie błony komórkowej
  - B - są inhibitorami gyrazy
  - C - hamowanie biosyntezy białek
-

12. Najbardziej toksycznym lekiem przeciwgrzybiczym jest

- A - itraconazol
  - B - ketokonazol
  - C - natamycyna
  - D - amfoterycyna B
- 

13. Maść przeciwgrzybicza LAMISILAT zawiera

- A - terbinafinę
  - B - tribenozyd
  - C - oksykarbamazepinę
  - D - natamycynę
- 

14. Mikonazol stosowany jest głównie miejscowo

- A - prawda
  - B - fałsz
- 

15. Fuzafungina zawarta jest w preparacie

- A - Davercin krem
  - B - Sulfarinol
  - C - Bioparox
  - D - Essentiale forte
- 

16. Perhydrol to

- A - 30 % roztwór Nadtlenku Wodoru
  - B - substancja przeciwbakteryjna
  - C - połączenie PERskiego HYDrantu z ROLkami
-



## Farmakologia

Poziom trudności: Średni

### Karta odpowiedzi

1. B
2. B
3. B
4. C
5. B
6. D
7. C
8. D
9. B
10. B
11. B
12. D
13. A
14. A
15. C
16. A